

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

syngenta

CENTRIC® 75 SG

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE
THIAMETHOXAM

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

Insecticida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

CENTRIC® 75 SG es un insecticida sistémico y translaminar, con amplio espectro de acción y rápida penetración. Actúa por contacto e ingestión interfiriendo los receptores de mensajes en el sistema nervioso de los insectos, ocasionando que estos dejen de alimentarse inmediatamente y mueran después.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Realizar aplicaciones dirigidas a la base de planta en un 70% a la planta (macolla) y un 30% sobre suelo, pueden hacerse con equipo terrestre, tratando de lograr la cantidad adecuada del producto. Todo equipo debe estar limpio y adecuadamente calibrado previo a la aplicación. Calibre siempre el equipo con agua, antes de aplicar el producto. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas y otros).

CENTRIC® 75 SG se podrá aplicar solamente con equipo terrestre, a baja altura sobre el nivel de las plantas, en horas tempranas de la mañana o por la tarde, cuando no haya viento y cuando el sol este menos caliente, para reducir la evaporación y arrastre del producto por viento, no aplicar con equipos tipo nebulizador o bombas de espalda de motor. Usar boquillas con ángulos de aplicación menores a los 80°. No utilizar boquillas que producen alta deriva, como las cónicas de alta presión. Trabajar a presiones de aplicación de 3 a 5 bares. Evitar las presiones altas mayores a 5 bares. Utilizar en el tanto de lo posible boquillas anti-deriva.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **CENTRIC® 75 SG**. Como con todos los productos químicos, **evite en lo posible el contacto con la solución**. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Agregar la cantidad recomendada de **CENTRIC® 75 SG** en un recipiente con agua para realizar una pre-mezcla. Esta agregarla al tanque que contiene el agua total a asperjar. Calibre el equipo adecuado previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. El pH adecuado del agua a utilizar debe estar entre un rango de 5 a 8. **Use la mezcla el mismo día de su preparación**. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: Botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado. Después de cada aplicación lave el equipo con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO:

Guatemala, El Salvador y Honduras

Caña de azúcar Saccharum officinarum	Salivazo	Aenolamia postica
--	----------	--------------------------

Panamá

Caña de azúcar Saccharum officinarum	Salivazo	Aenolamia spp
Arroz Oriza sativa	Sogatodes Chinches	Togasodes orizicolus Oebalus insularis

DOSIS RECOMENDADAS:

Caña de Azúcar: 0,2 kg PC/ha (0,14 kg PC/mz) aplicado a la base del tallo para el control de adultos e inmaduros.

Arroz: 30 g/ha (21 g/mz) para Sogatodes y 40 g/ha (28 g/mz) para Chinches.

Nicaragua

Caña de azúcar Saccharum officinarum	Salivazo	Aenolamia spp
--	----------	----------------------

DOSIS RECOMENDADA: 150-250 gramos/ha (105-175 gramos/mz).

Costa Rica

Caña de azúcar Saccharum officinarum	Salivazo	Aeneolamia postica
Arroz Oryza sativa	Sogata Chinche	Togasodes oryzicolus Oebalus insularis

DOSIS RECOMENDADA:

Caña de azúcar: 200 gramos/ha, realizando una sola aplicación por ciclo de cultivo, entre 30 y 60 días después de la corta del cultivo.

Arroz: Para control de Sogata 30 g/ha y para Chinche 40 g/ha.

NOTA: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Caña de azúcar: Entre 30 y 60 días.

Arroz: Aplicar nuevamente al alcanzar el umbral económico definido para la zona.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Caña de azúcar: 30 días.

Arroz: 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada una vez que se ha secado el rocío de la aspersión; de lo contrario, se recomienda usar el equipo de protección personal apropiado.

FITOTOXICIDAD:

Cuando se usa según las recomendaciones, **CENTRIC® 75 SG** es bien tolerado por los cultivos. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de productos insecticidas y fungicidas de uso agrícola. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto a productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en envases originales, bien cerrados y debidamente etiquetados con su correspondiente panfleto.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Causa leve irritación en la piel. Perjudicial si se inhala. Si se ingiere puede causar malestar estomacal con mareo, náusea y vomito. Puede causar ligera contusión y debilidad. Puede irritar la piel con prurito e irritar ojos con enrojecimiento y lagrimeo.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Trate sintomáticamente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital	223-1548 y 223-5693
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TOXICO PARA ABEJAS

No aplique sobre cultivos en floración atractivos para las abejas desde 20 días antes de la floración y hasta el final de la misma. No permita que la nube de aspersión derive hacia cultivos en floración o malezas. Aplicar el producto en horas de baja actividad de los polinizadores.

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Thiamethoxam es persistente en el suelo pero no en el agua.

Muy tóxico a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos duraderos. No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje o alcantarillas. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor.

CENTRIC® 75 SG no es explosivo ni corrosivo y no se considera altamente inflamable, pero puede descomponerse a altas temperaturas formando gases tóxicos.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada.

Para el caso de envases flexibles como bolsas plásticas o metalizadas y envases rígidos de papel o cartón, no deben lavarse. Inutilice los envases vacíos perforándolos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADO POR:

Gowan Milling LLC
12300 E County 8th Street, Yuma, AZ 85365,
Estados Unidos
Tel: ++ 1 928 3441014. www.syngenta.com

IMPORTADOR:

Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel, Ciudad de Guatemala. Tel. 2312-7000

El Salvador:
Duwest El Salvador, S.A.
Km.31 Carretera a San Juan Opico, Sitio del Niño la Libertad.
Tel (503) 2346-3200

Diagri, S.A. de C.V.
Km 28.5 Carretera a Sonsonate, Colón, La Libertad. Tel (503) 2319-5181

Honduras:

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua. Tel.: 2270-5008



Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 Mts. Este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría, Oficentro
Plaza Aeropuerto, Oficina H4 II Piso, Alajuela. Tel.: 2431-4707

Panamá:

Syngenta, S.A.

R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987, Business Park, Costa del Este,
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá, República de
Panamá. Tel.: 270-8200

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

GUATEMALA	302-270A
EL SALVADOR	AG2013050954
HONDURAS	996-346-III
NICARAGUA	SY-347C-6-2011
COSTA RICA	5333
PANAMÁ	5845