

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



ADAMA

## CUPRIMICIN 80 WP

FUNGICIDA, BACTERICIDA, BACTERIOSTÁTICO-ANTIBIÓTICO, INORGÁNICO  
ESTREPTOMICINA, OXITETRACICLINA, SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE

### ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



**USO AGRONÓMICO:** fungicida, bactericida de uso agrícola.

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** CUPRIMICIN 80 WP, fungicida, bactericida, resultado de la combinación de los antibióticos Estreptomicina y Oxitetraciclina y Cobre recomendado para el control de enfermedades fungosas y bacterianas. La Estreptomicina y la Oxitetraciclina son bactericidas de origen biológico que actúan por inhibición de la síntesis proteica. El cobre es un fungicida que actúa por contacto y su acción está limitada a la prevención de la germinación de esporas.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** La aplicación de este producto puede realizarse utilizando equipo de aspersión tipo mochila manual motorizado, estacionario a tractor y aéreo. Se recomienda utilizar boquilla de cono hueco. Al aplicar CUPRIMICIN 80 WP debe asegurarse que el equipo este en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas en buen estado y los filtros limpios y debidamente calibrados con agua. Utilice un equipo de aplicación que le asegure un buen cubrimiento sobre la planta, de tal forma que la mezcla de aplicación no gotee.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** En una cubeta con agua mezcle el producto necesario para la aplicación y agítese hasta producir una mezcla uniforme, agregue esta solución lentamente y agitándola a un tambor de 100 litros que contenga agua hasta la mitad, Posteriormente llénelo con el agua faltante; de esta forma quedará una mezcla uniforme y sin grumos. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5,5 a 6,5. El volumen de agua a utilizar dependerá del cultivo y del equipo aspersor que se use, es importante procurar cubrir el follaje. Cada vez que se requiera cargar la aspersora con solución, deberá agitarse la mezcla del tambor. Es recomendable utilizar de 500 a 1000 mL de glicerina por cada 100 litros de agua para aumentar la penetración de la Estreptomicina y de la Oxitetraciclina, y por lo tanto la efectividad de CUPRIMICIN 80 WP en las aspersiones.



**Ciente:**

Adama

**Fecha:**

3 feb. 2024

**Arte:**

Cuprimicin 80 WP panfleto,  
HN,NI,PA,RTCA

**Dimensiones:**

8.5" x 11"  
pag 1/2

**Colores:**



Negro

**RECOMENDACIONES DE USO:  
USO AUTORIZADO EN HONDURAS Y PANAMA**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Aguacate <i>Persea americana</i>	Sarna <i>Sphaceloma persea</i> Mancha angular <i>Cercospora purpurae</i>	400-600 g en 200 L de agua	Aplicarlo en forma preventiva determinando el umbral económico
Cacao <i>Theobroma cacao</i>	Mazorca negra <i>Phytophthora palmivora</i>		
Café <i>Coffea arabica</i>	Chasparria <i>Cercospora coffeicola</i>		
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Pudrición suave <i>Erwinia carotovora</i>		
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mancha bacteriana <i>Xanthomonas phaseoli</i>		
Plátano/Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka amarilla <i>Mycosphaerella musicola</i>		
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria longipes</i> Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i>		

**USO AUTORIZADO EN NICARAGUA**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Café <i>Coffea arabica</i>	Chasparria <i>Cercospora coffeicola</i>	400-600 g en 200 L de agua	Aplicarlo en forma preventiva determinando el umbral económico
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria longipes</i> Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i>		
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ) Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> ), Chile ( <i>Capsicum annum</i> )	Tizón de fuego <i>Erwinia amylovora</i>		

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** aplicar cada 7 días con infestaciones altas y cada 15 días con infestaciones bajas. No exceder de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

**INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** CUPRIMICIN 80 WP es bien tolerado por los cultivos, sin embargo, se deben suspender las aplicaciones de 3 a 4 semanas antes de la cosecha del cultivo.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** no existe restricción.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar con otro producto.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA Y SOMBRERO, PROTECTOR DE OJO, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** CUPRIMICIN 80 WP es ligeramente tóxico. En caso de ingestión produce molestias estomacales, dolor con ardor en el pecho y abdomen, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza y sudor. Irrita la piel temporalmente.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** El tratamiento médico es sintomático. No hay antídoto específico.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

INSTITUCIÓN	PAÍS	TÉLEFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560 / 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Escuela	Honduras	2232-2322/2232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	2289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	(507) 523-4948

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

El producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

**FORMULADOR:**

Ingeniería Industrial, S.A. de C. V.  
Carretera a Tecuaititán Km 0.676,  
San-Miguel Zapotitlán,  
C.P 45977, Poncitlán, Jalisco, México.  
Tel: +52 391 9217293  
Potrerillos, No.06, Col.  
Parque Industrial Nezahualcóyotl, CP.57810,  
Nezahualcóyotl, México-Tel: +52 5551132606

**IMPORTADOR:**

<b>PAÍS Y</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO:</b>
HONDURAS	296-148-II
NICARAGUA	INID-134B-4-2006
PANAMA	1836

**Cliente:**

Adama

**Fecha:**

3 feb. 2024

**Arte:**

Cuprimicin 80 WP panfleto,  
HN,NI,PA,RTCA

**Dimensiones:**

8.5" x 11"  
pag 2/2

**Colores:**



Negro