

**DOBRO 37.5 SL
(FOMESAFEN + FLUZIFOP-P-BUTYL)**

INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO QUÍMICO	ORGANOCOLORADO, ARILOXIFENOXIPROPIONATO
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC)	Fomesafen 5-(2-chloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyloxy)- Nmesyl-2-nitrobenzamide Fluazifop-P-butyl butyl (R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy}propionate
FÓRMULCIÓN	Suspensión concentrada (SC)
CONCENTRACIÓN	375 g de ingrediente activo por litro de producto comercial
CATEGORIA TOXICOLÓGICA	5 (ATENCIÓN)

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

MODO DE ACCIÓN	DOBRO 37.5 SL , es un herbicida sistémico y de contacto. En hojas anchas, es absorbido por el follaje y raíces con limitada translocación en el floema. En gramíneas, es absorbido por el follaje, acumulándose en los meristemos en plantas anuales y en los rizomas y estolones en plantas perennes, es traslocado por xilema y floema.
MECANISMO DE ACCIÓN	DOBRO 37.5 SL , en hojas anchas, actúa en la inhibición de las enzimas PPO alterando el sistema fotosintético de la planta y en gramíneas, inhibe la acetil CoA carboxilasa (ACCase), enzima catalizadora del primer paso en la síntesis de nuevos ácidos grasos.

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE EMPLEO	DOBRO 37.5 SL puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión de espalda manual, eléctrica o motorizada, así también con equipo accionado por tractor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión esté en buen funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda utilizar boquilla de abanico plano como la TJ-8002.
-----------------------	--

**PREPARACIÓN DE
MEZCLA**

Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre en un rango de 5-7. Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad de su capacidad, luego agregue la dosis recomendada de **DOBRO 37.5 SL** y agite. Complete el volumen de agua requerido y agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección personal.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Frijol <i>Phaseolus vulgaris L.</i>	Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Arrocillo <i>Digitaria sanguinalis</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Zacate Jhonson <i>Sorghum halepense</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Lechosa <i>Euphorbia hirta</i>	0.75 – 1.00 L/ha (0.53 – 0.70 L/mz) Volumen de agua:
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Lechugilla roja <i>Emilia forbergii</i> Amaranto <i>Amaranthus spinosus</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Flor amarilla <i>Galinsoga parviflora</i> Hierba de pollo <i>Commelina diffusa</i> Chicalote <i>Argemone Mexicana</i>	200 - 400 L/ha (140 - 280 L/mz)

OBSERVACIONES

Aplicación del producto en presencia de malezas, con una aplicación en postemergencia, a los 15 a 30 días después de la siembra.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA	12 horas. Si es necesario ingresar al área tratada antes que seque el producto, utilizar el equipo de protección personal recomendado para el uso de aplicación
PERIODO DE CARENIA	Se recomienda esperar por lo menos 60 días.
INTERVALO DE APLICACIÓN	Una aplicación por ciclo de cultivo a los 15 a 30 días después de la siembra.
COMPATIBILIDAD	Compatible con coadyuvantes o reguladores de pH de agua. Se recomienda realizar pre mezclas a pequeña escala.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si se aplica en las dosis recomendadas y respetando los intervalos de aplicación.

ALMACENAMIENTO

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y de llamas lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas, y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No dejar envases sin cerrar

INFLAMABILIDAD

No inflamable.

INFORMACION DE REGISTRO

PRESENTACIONES

100, 125, 250, 500 mililitros; 1, 3.5, 4, 5, 10, 18, 20, 50, 100 Litros

No. DE REGISTRO