


¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



DOMADOR 30 SE

INSECTICIDA- NEONICOTINOIDE, FENIL ÉTER
ACETAMIPRID, PYRIPROXYFEN

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.016 g/mL a 20° C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

Insecticida sistémico, de aplicación foliar, para el control de insectos chupadores que afectan a cultivos de hortalizas y frutales, tanto a campo abierto como bajo cobertura.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DOMADOR 30 SE es un insecticida sistémico y traslaminar. DOMADOR 30 SE se trasloca en la planta vía xilema. Actúa por ingestión y de contacto directo, inhibe los receptores de acetilcolina afectando el sistema nervioso central y el crecimiento al suprimir la embriogénesis, metamorfosis y reproducción.

EQUIPO DE APLICACIÓN: DOMADOR 30 SE puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión de espalda, manual, eléctrico o de motor, así también con equipo accionado por tractor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión este en buen estado de funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Utilice boquillas de cono hueco. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y de protección.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre dentro de un rango 5-6. Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad de su capacidad, luego agregue la dosis recomendada de DOMADOR 30 SE y agite, complete el volumen de agua requerido, agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación. Al momento de manipular el producto, preparar la mezcla y realizar la aplicación se debe utilizar equipo de protección: camisa manga larga, overol, pantalones, botas de hule, mascarilla, lentes y guantes. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección personal.



RECOMENDACIONES DE USO:

Recomendado para su uso en Guatemala y El Salvador.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Frijol Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.46-0.57 L/ha (0.322-0.40 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 8 a 10 días.
Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.35-0.50 L/ha (0.245-0.35 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 10 a 14 días.
Chile <i>Capsicum annuum</i>	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.35-0.57 L/ha (0.245-0.40 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Limon <i>Citrus latifolia</i>	Mosca prieta <i>Aleurocanthus woglumi</i>	0.46-0.57 L/ha (0.322-0.40 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Repollo <i>Brassica oleracea var capitata</i> Brócoli <i>Brassica oleracea var italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var botrytis</i>	Afidos <i>Brevicoryne brassicae</i>	0.20-0.40 L/ha (0.14-0.28 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Melon <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Calabaza <i>Cucurbita maxima</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.35-0.75 L/ha (0.245-0.53 L/mz)	De 1 a 3 aplicaciones cada 7

Recomendado para su uso en Nicaragua

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	350 - 700 ml/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplique DOMADOR 30 SE a las dosis recomendadas cuando las poblaciones de la plaga alcancen los umbrales económicos. Realice un máximo de 2 aplicaciones consecutivas de DOMADOR 30 SE por ciclo de cultivo, sin exceder un máximo de 3 aplicaciones/ciclo de cultivo. Ver observaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Frijol y ejote: 14 días
Papa, tomate y chile: 14 días
Limon: 14 días
Repollo, brócoli, coliflor: 14 días
Melon: 3 días
Sandía, Pepino y Calabaza: 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas. Por deriva o mala aplicación puede causar efectos sobre cultivos de hoja ancha susceptibles a este producto. Por su residualidad, no se recomienda sembrar cultivos de hoja ancha antes de 30 días de aplicado en condiciones de precipitación adecuada. No aplicar a maíz dulce o maíz tratado por organofosforados ya que puede dañarlo.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos ácidos o alcalinos fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga, pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. Producto no inflamable, no corrosivo, ni explosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación en los ojos, nariz y garganta. Dolor de cabeza, vértigo, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos, debilidad muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Dar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAIS	INSTITUCIÓN	No. TELEFONO
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	1-801-0029832
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700 ext. 17/ Celular: 8755-0983

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TOXICO PARA EL GANADO



TÓXICO PARA PECES O CRUSTACEOS



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA AVES



“NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO,
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS”

ESTE PRODUCTO ES PERSISTENTE EN AGUA Y NO PERSISTENTE EN SUELO
NO ES INFLAMABLE NI CORROSIVO.

“RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES”

“NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO”

“ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO”

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnica aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto debe ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos. En caso de derrames aplique una solución de cloro al área contaminada, luego absorba con aserrín u otro material similar, recoja el aserrín y entiérrelo alejado de fuentes de agua.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control sobre la aplicación, dosificación y mezcla con otros productos y otros factores relacionados con el uso directo de este producto, el formulador y distribuidor no se responsabilizan de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de éste.

FORMULADO POR:

FORAGRO, S.A.
Km. 156 Carretera al Semillero, Tiquisate, Escuintla,
Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2329-1919. email: info@foragro.com

IMPORTADOR EN EL SALVADOR:

FORAGRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 67.5 Carretera a metapan, beneficio el trapiche,
bodega 2, Agdo, S.A., Santa Ana, Santa Ana

DISTRIBUIDOR EN EL SALVADOR:

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A.
5a. Avenida Norte, 19 Calle Poniente, Edificio Fertica,
San Salvador, El Salvador, C.A.

DIAGRI S.A. DE C.V.
6ta. Calle Oriente No. 24 Barrio El Angel
El Rosario, depto La Paz, El Salvador

SERVICIO AGRÍCOLA SALVADOREÑO, S.A.
Boulevard del Ejército Nacional Km 3,
San Salvador, El Salvador

VILLAVAR, S.A. DE C.V.
Km. 30 Carretera a Santa, La Libertad, El Salvador
Tel (503) 2327-6700

PAIS
GUATEMALA
EL SALVADOR

No. DE REGISTRO
752-291
752-291