

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE  
MANIPULAR EL PRODUCTO



# FOLIFER

FERTILIZANTE FOLIAR

Composición química:	% p/v
Nitrógeno (N).....	11,00
Fósforo (P2O5).....	8,00
Potasio (K2O).....	8,00
Azufre (S).....	0,184
Magnesio (MgO).....	0,027
Boro (B).....	0,18
Hierro (Fe).....	0,088
Manganeso (Mn).....	0,088
Molibdeno (Mo).....	0,0044
Cobre (Cu).....	0,045
Zinc (Zn).....	0,045
Agua.....	C.S.P.

## PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

**POR INGESTIÓN:** Lleve inmediatamente al paciente al médico o centro de salud más cercano.

**POR INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado, manténgalo en reposo y vigile la respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Qúitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón.

## MEDIDA DE MITIGACIÓN AL AMBIENTE:

No almacene este producto en casa de habitación. Manténgalo bajo llave fuera del alcance de los niños y personas discapacitadas. Utilice el equipo de protección personal al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación.

Transporte y almacene este producto en su envase original, debidamente etiquetado y separado de alimentos de consumo humano, animal, incluyendo herbicidas.

Mediante Buenas Prácticas Agrícolas, utilice el producto a asperjar durante la jornada de trabajo, esto evitara remanentes. Realice triple lavado a los envases vacíos y deposítelos en lugares autorizados. No contamine fuentes de agua.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto debe ser almacenado y transportado en su envase original, etiquetado, en un lugar ventilado bajo llave, alejado de niños y animales domésticos, no transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa o utensilios se uso personal.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Utilice el equipo de protección personal, verifique que la aspersora esté en buen estado de funcionamiento, calibrado.

## CULTIVOS:

Solanáceas, cucurbitáceas, gramíneas. Utilice el equipo de protección personal, verifique que la aspersora esté en buen estado de funcionamiento, calibrado. En solanáceas debe ser asperjado en la etapa vegetativa y reproductiva a partir de los 20 días, después de germinado o transplantado respectivamente. Se recomiendan 5 aspersiones a un intervalo de cada 10 días.

**DOSIS:** 2 L/ha (1,4 L/mz)

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** En tanque de agua conteniendo la mitad del volumen de agua a utilizar, vierta la dosis requerida, agite para diluir el producto.

**FORMA DE APLICACIÓN:** Vía foliar.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se conoce ningún tipo de incompatibilidad, realizar pruebas de estabilidad antes de utilizar.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico, a las dosis y cultivos recomendados.

## FORMULADOR: AGROCENTRO, S.A.

Ofibodegas La Esperanza, Micro Parcela 6, Finca La Esperanza Km 69,5 Carretera a Puerto Quetzal, Escuintla, Guatemala, C.A.

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

El Salvador

CINDECO, S.A. de C.V.

km 25 1/2 carretera a Sonsonate, Cantón Lourdes, Colón, La Libertad, Bodega No. 6, El Salvador.

Página web: agrocentro.com

Tel: (503)2305-0559 y 2305-0560

PAÍS  
EL SALVADOR

NÚMERO DE REGISTRO  
FE2019082121