



TRATASEM 35 FS

INSECTICIDA - CARBAMATO

THIODICARB

Composición Química:	%m/v
(3EZ,12EZ)-3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione.....	35,00
Ingredientes inertes.....	78,00

Contiene: 350 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

TRATASEM 35 FS es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión, con movimiento acropetal. TRATASEM 35 FS actúa sobre el sistema nervioso, activando los receptores de la acetilcolina nicotínica, generando parálisis inmediata de la plaga e inhibe la colinesterasa que bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos en los insectos, causando un colapso.

EQUIPO DE APLICACIÓN

TRATASEM 35 FS puede ser aplicado de forma manual utilizando una bolsa plástica resistente o una mezcladora para semillas. Antes de la aplicación revisar que la mezcladora de semillas esté en buen funcionamiento o que la bolsa plástica esté sin perforaciones. Verificar que esté aplicando la dosis correcta según el peso recomendado.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue la cantidad necesaria de semilla dentro de la mezcladora, agregue la dosis recomendada de TRATASEM 35 FS de acuerdo al peso de la semilla. Luego agite la semilla hasta que el producto esté impregnado homogéneamente. El tratamiento de semilla deberá ser efectuado en un lugar específico para ese fin. Realizar la siembra hasta que el producto se haya secado completamente en la semilla. Después de cada tratamiento de semilla lave el equipo de mezcla y protección personal.



RECOMENDACIONES DE USO AGRONÓMICO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo o maicillo <i>Sorghum vulgare</i> Soya <i>Glycine max</i>	Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> Tortuguilla <i>Diabrotica</i> spp. Gusano tierrero <i>Agriotes</i> spp. Gallina ciega <i>Phyllophaga</i> spp. Gusano alambre <i>Agriotes</i> spp. Gusano cogollero <i>Spodoptera</i> spp. Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	21.7 ml/kg de semilla (9.86 ml/lb de semilla)

INTERVALO DE APLICACIÓN

Una aplicación directamente sobre la semilla.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

No aplica porque se realiza una sola aplicación a la semilla antes de la siembra.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Esperar mínimo 24 horas para entrar a un lote sembrado con semilla tratada con TRATASEM 35 FS.

FITOTOXICIDAD

No fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Debido a que es tratador de semillas, se aplica solo. No es compatible con otros productos basados en cobre y magnesio, productos basados en zinc u otras fórmulas basadas en aceite o con diluyentes de aceite vegetal.