

# Paraquat Alemán

20 SL

## Descripción del producto:

PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL es un herbicida no selectivo, de contacto.

**COMPOSICIÓN:** 200 gramos de Paraquat por litro de producto comercial, en Solución Líquida

**MODO DE ACCIÓN:** PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL es absorbido por el follaje de las malezas de hojas anchas y gramíneas. Después de pocas horas de haberse asperjado, se aprecia un amarillamiento. Se inactiva rápidamente en el suelo, adhiriéndose fuertemente a las arcillas

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Actúa en el cloroplasto. Especialmente sobre el sistema de membranas de la fotosíntesis, denominado Fotosistema I. Desintegra membranas y tejidos de las células.

## Presentaciones:

500 ml, 1L, 3.5L, 5L, 18L y 200 L

## Cultivos donde se utiliza:

Maíz, Sorgo, Maicillo  
Caña de Azúcar  
Arroz  
Papa  
Banano y Platano  
Café  
Cítricos  
Aguacate  
Palma Africana  
Hule  
Piña

## Indicaciones generales:

**Incompatibilidad:** No existe incompatibilidad conocida con otros agroquímicos hasta el momento. Para realizar mezclas se recomienda que PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL se mezcle con productos que cuenten con registro en los cultivos indicados.

**FITOTOXICIDAD:** PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL por ser un herbicida de contacto no selectivo, es fitotóxico si no se utiliza solamente en las especies sujetas a control, se emplea adecuadamente y se cumplen las medidas de seguridad mencionadas.

### CONTRAINDICACIONES:

- Aplíquense las dosis y volúmenes altos cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento.
- Todas las aplicaciones de PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL requieren de una buena cobertura.
- Evítese que la aspersión se desvíe a otros cultivos, PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL destruye todos los tejidos verdes.

## Instrucciones de manejo:

**pH ÓPTIMO DEL AGUA:** 5 a 6. Estable, salvo condiciones muy alcalinas

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Cuando las malezas tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Mezcle la cantidad requerida de PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL con agua limpia en el tanque del equipo de aspersión y agite. Utilice de 200 a 300 litros de agua por Ha.

**RECOMENDACION IMPORTANTE:** Cuando prepare PARAQUAT ALEMÁN® 20 SL utilice agua limpia, libre de sedimentos.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón de la aspersora esté ajustado a una altura adecuada que garantice la cobertura total.

II MODERADAMENTE PELIGROSO

Malezas	Dosis	I.A.C*	I.R**
Bejuco ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Campanilla o Bejuco ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ) Amargosa ( <i>Parthenium hysterophorus</i> ) Dormilona, Zarza ( <i>Mimosa púdica</i> ) Hierba de pollo ( <i>Commelina diffusa</i> ) Flor amarilla ( <i>Melampodium divaricatum</i> ) Apazote silvestre ( <i>Chenopodium album</i> ) Lentijilla ( <i>Lepidium sp.</i> ) Bledo o Hüisquelete ( <i>Amaranthus sp.</i> ) Rabanillo silvestre ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Zacate Bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Zacate de agua o Arrocillo ( <i>Echinochloa colona</i> ) Zacate Honduras ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Coyolillo ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )	Se encuentra en un rango de 1.5 a 3 litros por Hectárea. De 1 a 2 litros por manzana	No aplica	24 horas Si fuese necesario reingresar, es conveniente esperar más de 2 horas para hacerlo

\*Intervalo entre la última aplicación y cosecha \*\*Intervalo de reíngreso

### Principales malezas que controla



Bejuco (*Convolvulus arvensis*)



Dormilona, Zarza (*Mimosa púdica*)



Flor amarilla (*Melampodium divaricatum*)



Zacate Bermuda (*Cynodon dactylon*)



Zacate camalote (*Brachiaria plantaginea*)



Pata de gallo (*Eleusine indica*)

