

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA  
ESSENTIALS



# TAYTA 16 ME

HERBICIDA – ÁCIDO PIRIDIN CARBOXÍLICO  
FLUROXYPYR, PICLORAM

**ATENCIÓN**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

SOLVENTE: Nafta

DENSIDAD: 1,083 g/ml a 20° C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD METAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**USO AGRONÓMICO:** Es un herbicida sistémico a base de picloram y fluroxypyr para el control selectivo de malezas de hoja ancha, anuales y perennes.

**MODO DE ACCIÓN:** El Tayta 16 ME es un herbicida sistémico a base de picloram y fluroxypyr para el control selectivo de malezas de hoja ancha, anual y perenne. Tayta 16 ME bloquea el proceso normal de crecimiento, lo cual conlleva a la pérdida de la función de las raíces, bloqueo de floema, inhibición de la fotosíntesis y finalmente la muerte.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Tayta puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. Utilice boquilla de abanico plano tipo 8002 ó 8003. El producto no causa daños fisicoquímicos al equipo de aplicación ni utensilios usados



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen total de 400-600 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5,5 – 6,5. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos.



**Cliente:**

Adama

**Fecha:**

20 abr. 2021

**Arte:**

TAYTA 160 ME(CO)  
X PANFLETO,  
HN,NI,PA,RD, RTCA

**Dimensiones:**

215 x 280 mm  
página 1/2

**Colores:**



Negro

RECOMENDACIONES DE USO:  
USOS AUTORIZADOS, HONDURAS, PANAMA, REPUBLICA DOMINICANA.

| CULTIVO                                        | PLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOSIS              | OBSERVACIONES                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caña de azúcar<br><i>Sacchsrum officinarum</i> | Escobilla <i>Sida</i> spp,<br>Ciperáceas <i>Cyperus</i> spp,<br>Batatilla <i>Ipomoea</i> spp,<br>Dormilona <i>Mimosa pudica</i> , Aromo <i>Acacia</i> spp,<br>Meloncillo <i>Cucumis</i> spp, Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> ,<br>Frijolillo <i>Cleome aculata</i> | 100-150 ml/ha      | Efectué la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista una buena humedad del Suelo.                                            |
| Arroz<br><i>Oryza sativa</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-400 ml /ha     | Aplicar cuando las malezas tengan 4 a 5hojas verdaderas y antes de los 30 días de edad del cultivo. Se puede utilizar un volumen de aplicación de 200 L/ha. |
| Pastos                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 ml / 20 Litros | Efectué la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista una buena humedad del Suelo.                                            |
| Palma Africana<br><i>Elaeis guineensis</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500-2000 ml/ha    | Efectué la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista una buena humedad del Suelo.                                            |

USOS AUTORIZADO EL SALVADOR.

| CULTIVO | PLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOSIS              | OBSERVACIONES                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastos  | Escobilla <i>Sida</i> spp,<br>Ciperáceas <i>Cyperus</i> spp,<br>Batatilla <i>Ipomoea</i> spp,<br>Dormilona <i>Mimosa pudica</i> , Aromo <i>Acacia</i> spp,<br>Meloncillo <i>Cucumis</i> spp, Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> ,<br>Frijolillo <i>Cleome aculata</i> | 100 ml / 20 Litros | Efectué la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista una buena humedad del Suelo. |

USOS AUTORIZADO NICARAGUA.

| CULTIVO    | PLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOSIS      | OBSERVACIONES                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastizales | Escobilla <i>Sida rhombifolia</i> ,<br>Cinco Negritos <i>Lantana camara</i><br>Cassia hedionda <i>Cassi tora</i><br>Dormilona <i>Mimosa pigra</i><br>Corn<br>Ciperáceas <i>Cyperus</i> spp, Batatilla <i>Ipomoea</i> spp, Dormilona <i>Mimosa pudica</i> , Aromo <i>Acacia</i> spp, Meloncillo <i>Cucumis</i> spp, Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> , Frijolillo <i>Cleome aculata</i> | 1,5-2 L/ha | Efectué la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista una buena humedad del Suelo. |

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** En caso de aplicarlo más de una vez se recomienda esperar al menos de 30 - 45 días entre la primera y segunda aplicación.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Si el pasto será utilizado como alimento, esperar al menos 30 días antes de cosecharlo. En caña de azúcar 210 días. En arroz aplicar antes de los 30 días de edad.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas. O utilizar el equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis y a los cultivos recomendados en esta etiqueta. Por deriva daña cultivos susceptibles como: papa, papaya, tomate, chile y otros cultivos anuales y perennes de hoja ancha.

**COMPATIBILIDAD:** No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación de la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

| PAÍS                 | INSTITUCIÓN                                                     | TELÉFONO           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Guatemala            | Centro de Información y Asistencia Toxicológica                 | (502)2251-3560/ 22 |
| El Salvador          | Hospital Nacional Rosales                                       | (503) 2231-9262    |
| Honduras             | Hospital Escuela                                                | (504) 232-6105     |
| Nicaragua            | Centro Nacional de Toxicología                                  | (505) 2289-4700 ➡  |
| Costa Rica           | Centro Nacional de Intoxicaciones                               | 8755-0983          |
| Panamá               | Centro de Investigación e información de Medicamentos y Tóxicos | (506) 2223-1028    |
|                      |                                                                 | (507) 523-4948     |
| República Dominicana | Hospital Dr. Luis E. Aybar                                      | 684-3478           |
|                      | Hospital Dr. Francisco Moscoso                                  | 681-6922/291       |



PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**PELIGROS FÍSICOQUÍMICOS:** el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recóléctelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

FORMULADO POR:

**ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA**  
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca  
Tels: 5-3799771 + 74 - 3799715  
**BARRANQUILLA, COLOMBIA**  
**IMPORTADOR:**

| PAÍS           | NÚMERO DE REGISTRO |
|----------------|--------------------|
| HONDURAS       | 1236, F647, TI     |
| NICARAGUA      | ADM-39S-2019       |
| PANAMÁ         | 9525               |
| REP DOMINICANA | 7828               |
| EL SALVADOR    | AG2021061515       |

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Cliente:

Adama

Fecha:

20 abr. 2021

Arte:

TAYTA 160 ME(CO)  
X PANFLETO,  
HN,NI,PA,RD, RTCA

Dimensiones:

215 x 280 mm  
página 2/2

Colores:



Negro