¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS

TBZ 50 SC

FUNGICIDA- BENZIMIDAZOL
THIABENDAZOLE

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.15 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"
"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"

USO AGRONOMICO:
TBZ 50 SC Es un fungicida de amplio espectro, utilizado para el control de hongos fitopatogenos, que afectan a las plantas y a los frutos, se aplica tanto en cultivo como a frutas en post-cosecha

MODO DE ACCION:
TBZ 50 SC es un fungicida sistémico, protectante y curativo. Inhibe la síntesis de tubulina, comprometiendo el cito esqueleto de las células, lo cual afecta el crecimiento y desarrollo de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Tratamiento post cosecha: **TBZ 50 SC** puede ser aplicado por rocío, con cualquier equipo de aspersión, como bombas de espalda, cámaras automáticas, boquillas individuales, sistemas de cascada o de inmersión. Aplicación a la base de las plantas: **TBZ 50 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión, ya sea de espalda, manual, eléctrico o de motor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspresión este en buen estado de funcionamiento sin fugas. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que este aplicando la dosis correcta. Utilice boquillas de cono hueco.

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre dentro de un rango 5-6. Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad con agua, luego agregue la dosis recomendada de **TBZ 50 SC** y agite, complete el llenado con agua, agite y aplique. Despues de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección.

RECOMENDACIONES DE USO: Recomandado para su uso en Guatemala y El Salvador.

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Banano y plátano ***Musa* spp.**	Pudricion de la corona ***Fusarium pallidoroseum***	**Aplicación post-cosecha** Tránsito < 1 semana: 40 mL / 100 L de agua Tránsito > 1 semana: 80 mL / 100 L de agua Tránsito > 25 días: 150 mL / 100 L de agua
Papaya ***Carica papaya***	Antracnosis ***Colletotrichum gloeosporioides***	**Aplicación post-cosecha** 40 - 50 mL/100 L de agua
Cebolla ***Allium cepa***	Pudrición blanca ***Sclerotium cepivorum***	2.5 - 3-6 L / ha 1.75 - 2.52 L/mz
Café ***Coffea arabica***	Mal del talluelo ***Rhizoctonia solani***	Almácigo: 2.5 - 3 mL/L agua (25 mL de la mezcla por planta)
Limon ***Citrus latifolia***	Moho verde ***Penicillium digitatum***	8 - 10 mL/L agua
Tomate ***Solanum lycopersicum***	Mal del talluelo ***Rhizoctonia solani*** ***Fuzarium oxysporum f.sp. Lycopersici***	36 - 40 mL/100 L de agua aplicación dirigida a la base de las plantas. Aplicar 30 mL de la mezcla por planta

INTERVALO DE APLICACION:
Banano, plátano, papaya y limón: una sola aplicación a los frutos en post cosecha.
Café y cebolla: 2 aplicaciones a los 15 y 30 días después del transplante.
Tomate: Realizar 2 aplicaciones, 5 y 20 días despues del transplante.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Banano, Platano, Limon y Café: Por el momento de aplicación. No existe restricción.
Cebolla: 7 días
Tomate: 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA CON EL PRODUCTO:
Tratamiento Post cosecha. Sin restricción.
Aplicación en campo 12 horas.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de plaguicidas. Evitar mezclas con productos alcalinos, que contengan cobre y con agentes oxidantes. Siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otro producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicacion, use la ropa de proteccion. sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga, pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Este producto no es inflamable ni explosivo. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, herbicidas, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de llamas, de los niños, los animales domesticos y personas discapacitadas. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SINTOMAS DE INTOXICACION:
Nocivo por ingestión. Puede irritar los ojos. Puede provocar lagrimeo y enrojecimiento de ojos. Puede irritar la piel. Los síntomas de intoxicación incluyen dificultad respiratoria, disminución de los reflejos, letargo, temblores y en casos severos, convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud mas cércano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)
EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto. (etiqueta o panfleto)

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO:
No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicologica CIAT	1-801-0029832
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9162

PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

PERSISTENTE EN AGUA Y EN SUELO.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.
RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAJILES NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.
ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto deben ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos. En caso de derrames absorba con tierra, arena o arcilla, recojala y depósitela en un lugar destinado para posterior eliminación.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
El formulador garantiza que el contenido de este envase esta acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control sobre la aplicación, dosificación y mezcla con otros productos y otros factores relacionados con el uso directo de este producto, el formulador y distribuidor no se responsabilizan de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de éste.

FORMULADO POR:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE, CO., LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province,
China.

IMPORTADOR EN EL SALVADOR:
FORAGRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 67.5 Carretera a metapan, beneficio el trapiche,
bodega 2, Agdo, S.A., Santa Ana, Santa Ana

DISTRIBUIDOR EN EL SALVADOR:

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A.
5a. Avenida Norte, 19 Calle Poniente, Edificio Fertica,
San Salvador, El Salvador, C.A.

VILLAVAR, S.A. DE C.V.
Km. 30 Carretera a Santa, La Libertad, El Salvador
Tel (503) 2327-6700

SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A.
Boulevar del Ejercito Nacional Km 3,
San Salvador, El Salvador

DIAGRI S.A. DE C.V.
6ta. Calle Oriente No. 24 Barrio El Angel
El Rosario, depto La Paz, El Salvador

PAIS	No. REGISTRO
GUATEMALA	752-286
EL SALVADOR	752-286