

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	2252-3560/2232-0735
Belice	Centro de Intoxicación Karl Huesner Memorial Hospital	231-548/231-639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	22322322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	289-4514
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	223-1028
Panamá	Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTACEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES NO
APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LAS ESCORRENTÍA
O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL
CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN)
QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar
por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enviarse al centro de acopio más
cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua
superficiales o subterráneas, alcantarillas o cualquier otro recurso natural ni tampoco cerca de viviendas.
Estos de preferencia deberán ser recogidos en contenedores especiales y apropiados para su posterior
descarte y eliminación de acuerdo a las regulaciones locales

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTES PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y/o formulador garantiza la calidad de este herbicida, siempre que se encuentre en su envase
original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Pero no da garantía por posibles daños que
pudieran ocurrir debido a su uso o almacenamiento inadecuados. El consumidor adquiere el producto con
pleno conocimiento de ello. El material contenido en este envase concuerda con la descripción química
indicada en la etiqueta que es apto para el uso de acuerdo con las instrucciones de este panfleto.

FORMULADO POR:
ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL
INDUSTRY GROUP CO., LTD
Zhongshan, Xiaopu, Changxing,
Zhejiang, China



IMPORTADOR:

DIAGRI, S.A. DE C.V.
6 Calle Ote. # 24, Bo. El Angel,
Rosario La Paz, Depto. La Paz
El Salvador

PAIS

EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA

**NUMERO DE
REGISTRO**
2003-02-661
958-400-I
BF-196H-2-2008

TRIAL 50 SC

**HERBICIDA-TRIAZINA
TERBUTRINA**

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.12 g/mL

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO: TRIAL 50 SC está recomendado para ser utilizado en el cultivo de Caña de azúcar
(*Saccharum officinarum*) para tratar las malezas indicadas en este panfleto.

MODO DE ACCIÓN: TRIAL 50 SC es un herbicida sistémico para control de malezas gramíneas y en menor
grado las de hoja ancha. Es eficiente como preemergente y como postemergente temprano (plantas menores
de 5 cm.)

EQUIPO DE APLICACIÓN: TRIAL 50 SC puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre o aéreo
de suspensión concentrada con agitador interno. Cuidar que el equipo esté limpio y correctamente calibrado.
Calibre el equipo adecuadamente, previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Calibre
siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté
en buenas condiciones.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: En un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con
todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una pasta uniforme. La misma se vierte en un
tanque el cual esté al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar. Para aplicaciones
aéreas, usar volúmenes de mezcla mayores a 25 l/ha (5 gl/mz) con boquillas de abanico plano y para
aplicaciones terrestres, se recomienda usar volúmenes de mezcla arriba de 150 l/ha (28 gl/mz), usando boquillas
de abanico. Al manipular TRIAL 50 SC durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación utilizar equipo
de protección (botas, mascarilla, anteojos, guantes y dosificador en buen estado).



RECOMENDACIONES DE USO: controla principalmente las plagas abajo descritas en el cuadro de recomendaciones:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	OBSERVACIONES
CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>)	Dicotiledóneas (de hoja ancha)	2.5-5.0 L/Ha (1.8-3.5 L/Mz)	Momento de aplicación: En pre-emergencia o post emergencia temprana de las malezas Intervalo de aplicación: No hay restricción
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Mozote (<i>Bidens pilosa</i>)		
	Campanilla (<i>Ipomoea</i> spp)		
	Huisquilite (<i>Amaranthus</i> spp)		
	Gramíneas (zacates)		
	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)		
	Gramalote (<i>Panicum fasciculatum</i>)		
	Setaria (<i>Setaria</i> spp)		
	Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
	Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>)		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
*Las dosis mayores son para suelos de tendencia arcillosa.			

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Se recomienda hacer la aplicación dirigida a las malezas por lo menos 90 días antes del inicio de la zafra, cuando las plantas del cultivo están recién emergidas del suelo. Esto es debido a que las aplicaciones deben realizarse cuando las hileras de siembra muestren una clara separación.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Al menos 24 horas después de efectuada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico para cualquier otro cultivo no indicado en este panfleto. Se advierte que las derivas de las aspersiones de este herbicida pueden causar daño en otras plantas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros herbicidas (Triazinas y sulfonilureas) actualmente en uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Este producto no es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. Evite almacenar este producto a temperaturas mayores de +35 grados centígrados. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en envases originales bien cerrados y debidamente etiquetados con su correspondiente panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIONES:
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Nausea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, irritación en los ojos, piel y mucosas.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTION: no induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta y panfleto)

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

Tratamiento médico: Proporcione tratamiento sintomático. Si el producto fue ingerido, haga un lavado gástrico. Administrar un laxante salino y prosiga con terapia de soporte.

